

Praktische Tipps zur Kulturführung von Argyranthemum

Boden

Verwenden Sie lockere, qualitativ hochwertige Pflanzerde. Meistens geht man aus von einem Mischverhältnis bestehend aus 50% Gartentorf und 50% Torferde. 10% Perlit kann bei einer Ebbe & Flut Anzucht (50% Gartentorf und 50% Torferde) hinzugefügt werden. Als Düngemittel können Sie 11,5 kg P.G. Mix hinzufügen.

Temperatur

Starttemperatur 15°C. Nachdem die Pflanze gut verwurzelt ist, kann man die Temperatur auf 12°C verringern. Wenn die Pflanzen zu schnell wachsen, können sie eine negative Dif (höhere Nacht- als Tagestemperatur) anwenden. Das heißt, man verringert die Temperatur um 3 bis 4 °C eine Stunde vor Sonnenaufgang und erhöht diese wieder circa 4 bis 6 Stunden nachdem die Temperatur eingestellt wurde. Hierdurch erzielen Sie ein kompakteres Wachstum.

Düngung

Die Pflanzen bei jeder Wassergabe düngen bei einem EC-Wert (Salzgehalt) von 2 bis 3; bei einem höheren EC-Wert (Salzgehalt) wird das Wachstum kompakter. Die Pflanzen aufziehen mit einem generativen Düngemittel, um einen kompakteren Wuchs zu fördern. Dies gilt vor allem für eine kleinere Pflanzengröße. Während der Blüte einige Mal abwechseln mit einer Mischung, die etwas mehr Stickstoff enthält, da die Pflanze während der Blüte mehr Stickstoff benötigt.

Wachstumsregulatoren

Durch die Anwendung von Dif (Unterschied zwischen Tages- und Nachttemperaturen) und eine so trocken wie mögliche Züchtung ist das Wachstum schon gut regulierbar. Zusätzlich können die folgenden Wachstumsregulatoren verwendet werden.

- Cycocel (750 Gramm / Liter): 60 bis 100 Kubikzentimeter auf 100 Liter Wasser
- Alar 85: 200 bis 300 Gramm auf 100 Liter Wasser
- Bonzi: 25 bis 200 Kubikzentimeter auf 100 Liter Wasser
- Tilt: 20 bis 60 Kubikzentimeter auf 100 Liter Wasser

Spritzen, wenn der Wurzelballen ausreichend feucht ist, morgens direkt nach Sonnenaufgang oder abends vor Sonnenuntergang (um Blattbrand vorzubeugen).

Wichtiger Tipp:

Hemmen Sie nach der Wassergabe, aber geben Sie kein Wasser hinzu, um das Pflanzenwachstum zu hemmen. Es empfiehlt sich, das Wässern so lange wie möglich hinauszuzögern, denn dadurch kann das Wachstum sehr gut reguliert werden.

Pflanzenschutz

- Botrytis kann mit Rovral, Teldor oder Thiram bekämpft werden.
- Luis kann mit Hilfe von Admire oder Plenum bekämpft werden.
- Die Minierfliege kann mit Vertimec oder einer doppelten Dosierung Admire bekämpft werden.

Überprüfen Sie bitte selbst, ob die von Ihnen angewandten Mittel im Land des Anbaus auch zugelassen sind. Hendriks Young Plants übernimmt hierfür keine Verantwortung.

Für weitere Informationen können Sie uns selbstverständlich jederzeit kontaktieren. Wir helfen Ihnen gern!